



新居浜市の皆さんへ

新型コロナワクチン接種

3回目接種についてのお知らせ



1月31日から高齢者の追加接種（3回目接種）が始まります

対象者 65歳以上の方で、初回接種（1・2回目接種）完了日から7か月以上※経過している方

※65歳以上の方については、2月以降、初回接種完了後7か月以上経過していれば接種できることとなりました。
（一般の方は初回接種完了後8か月以上経過した方が追加接種の対象となります）

使用するワクチン 追加接種では、初回接種（1・2回目接種）で接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。

3回目接種の安全性と効果

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

安全性

発現割合	ファイザー社	武田/モデルナ社
50%以上	疼痛、疲労	疼痛、疲労、頭痛
10 - 50%	頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛	筋肉痛、関節痛、悪寒、リンパ節症
1 - 10%	38度以上の発熱、腫脹、発赤、リンパ節症	38度以上の発熱、腫脹・硬結、紅斑・発赤

(注) 対象/人数: ファイザー2回目16~55歳/2,682人、ファイザー3回目18~55歳/289人、モデルナ2回目18歳以上/14,691人、モデルナ3回目18歳以上/167人
(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合: 5ポイント以上少ないもの、5ポイント以上多いもの。

出典: 特例承認に係る報告書より

効果

3回目接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても、安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(※)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

※武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。

ワクチンの組み合わせ			抗体価
ファイザー	ファイザー	モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー	ファイザー	ファイザー	

出典: Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

副反応（症状が出たとき）への対応方法

発熱や痛み

- 市販の解熱鎮痛薬（イブプロフェンやロキソプロフェン等）で対応いただけます。
- 発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
- 妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障害・喘息などの持病のある方は、薬剤師や医師にご相談ください。

かゆみや発赤


- かゆい場合は冷やしたり、抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬（軟膏等）を塗ると、症状が軽くなります。 ※症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をご検討ください。



感染予防対策を
継続していただくよう
お願いします。



密集場所



密接場面



密閉空間

【3つの密（密集・密接・密閉）】の回避



マスクの着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用アルコール
による消毒の励行

ワクチン接種の ご予約は

詳しくは市ホームページを
ご確認ください

01. 接種券が届く

封筒に「接種券が印字され
た予診票」と「予防接種済
証」が入っています。

02. 接種会場を探す

市HPやコロナワクチンナビ(右
記QR)で、接種可能な医療機
関や接種会場を探しましょう。



03. 予約して接種

コールセンターかWEBで予約しましょう。

コールセンター ☎ 0120-040-439
土日祝日可(8:30~19:00)

WEB <https://vaccines.sciseed.jp/niihama-wakuchin>

